

**Kills 130+
Insects
on Contact!**

**MONEY BACK
GUARANTEE***

For Outdoor Use Only

Spectracide[®]

TRIAZICIDE[®] INSECT KILLER

FOR LAWNS & LANDSCAPES

Insecticida para césped y jardín

Kills On Contact

**Long-Lasting
Formula**



Protects Lawns, Vegetables, Flowers, Trees & Shrubs
Ideal for spot treatment

Active Ingredient:
Lambda-Cyhalothrin..... 0.002%
Other Ingredients 99.998%

*Allegheny mound, Argentine,
black carpenter, cornfield, field,
Florida carpenter, harvest, honey,
pavement, southern, sugar, nuisance.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back booklet for additional
precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para conocer
las declaraciones preventivas adicionales.

**Net 1 gal
(128 fl oz/3.7 L)**



17-14380

Spectracide®

TRIAZICIDE® INSECT KILLER

FOR LAWNS & LANDSCAPES

insecticida para césped y jardín



**Kills 130+ Insects
on Contact**



Won't Harm Plants



Ready to Use



Long-Lasting Formula

PRODUCT FACTS

WHAT IT DOES:

Kills ants*, fleas, sod webworms, aphids, beetles, whiteflies, mites, deer ticks, Japanese beetles, European crane flies and other listed insects. *Allegheny mound, Argentine, black carpenter, cornfield, field, Florida carpenter, harvester, honey, pavement, southern, sugar, nuisance.

GUARANTEED RESULTS OR YOUR MONEY BACK

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

WHERE TO USE:

For use on vegetables, roses, flowers, shrubs, trees and other outdoor plants and surfaces.

QUESTIONS & COMMENTS:

Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

Distributed by Spectrum Group
Division of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-195-8845

EPA Est. Nos. 39754-W1-1 (R) 9089-MO-1 (U) 79533-W1-1 (T)

58996-MO-1 (AE) 11623-GA-1 (CE) 11623-GA-3 (CN)

Circled letter is first letter of bot number. 17-14381 © 2012 UIC

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
0 71121 10525 7

ABRA AQUÍ **PEEL HERE**
ETIQUETA RESEALABLE RESEALABLE LABEL

STOP

READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

STOP Do not allow children or pets into the treated area until dry.

- Do not water the treated area to the point of runoff.
- Do not make applications during rain.
- All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:
 - Treatment to soil or vegetation around structures
 - Applications to lawns, turf and other vegetation
 - Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 ft. Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications only.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or stream that drains directly into a coastal marsh.

ALTO

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.

ALTO No permita que los niños ni las mascotas entren en la zona tratada hasta que se seque.

- No riegue la zona tratada hasta el punto de escurrimiento.
- No realice aplicaciones durante lluvias.
- Todas las aplicaciones en espacios exteriores deben limitarse a tratamientos localizados o para tratar grietas y rajaduras exclusivamente, salvo los siguientes usos permitidos:
 - Tratamiento del suelo o vegetación alrededor de estructuras
 - Aplicaciones a céspedes y otra vegetación
 - Aplicaciones a cimientos de edificios, hasta un máximo de 3 pies de altura. A parte de las aplicaciones a los cimientos de edificios, todas las aplicaciones en espacios exteriores a superficies impermeables como aceras, caminos de entrada de automóviles, patios, porches y superficies estructurales (como ventanas, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones localizadas y para el tratamiento de grietas y rajaduras exclusivamente.
- Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier zona similar a una cuneta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, drenajes pluviales, masas de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.

En el Estado de Nueva York, no se podrá aplicar este producto en céspedes ubicados a una distancia de hasta 100 pies de un pantano costero o de un arroyo que desemboque directamente en un pantano costero.

HOW TO USE

BEFORE USE:

1. Shake well before each use.
 2. Peel sticker from flip-top cap and open cap. Discard sticker.
 3. Remove sprayer from its slot beneath the bottle handle and remove and discard plastic wrap. Pull black hose tip to completely extend tubing.
 4. Firmly press black hose tip into opening in cap until it snaps into place.
 5. Hold sprayer below the level of the container and prime by pumping trigger several times until product is dispensed.
 6. Adjust nozzle to desired setting.
- AFTER USE:**
7. To store, turn sprayer nozzle off.
 8. DO NOT disconnect hose.
 9. Return sprayer to its slot. Hose can be pushed back into sprayer handle.

NOTE: This product is not designed to mist or hose siding depending on age and cleanliness. However, before using in areas where the spray may contact home siding (vinyl siding in particular), test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Do not use if any staining is observed.

LAWNS • SURFACE INSECTS including ants*, armyworms, cockroaches (German and American), crickets, cutworms, earwigs, European crane flies, fleas, frit flies, green June beetles, lawn moths (sod webworms), millipedes, palmetto bugs, sowbugs, milks, spittlebugs, springtails, deer ticks (which may transmit Lyme Disease) and waterbugs. Thoroughly wet down grass a few hours before applying. Apply to lawn as a thorough coverage spray. One gallon will treat 250 sq ft. Delay additional watering or mowing for 24 hours after application for optimum control of surface insects. Treat ants and other insects when they first appear or you notice lawn damage. Do not apply more than 10 times per location, per year.

* Allegheny wood, Argentine, black carpenter, confield, field, Florida carpenter, harvester, honey, pavement, southern, sugar, nuisance.

PESTS OUTSIDE THE HOME • To kill ants*, centipedes, cockroaches, crickets, fleas, flies, gnats, millipedes, mosquitoes, pillbugs, scorpions, sowbugs, spiders and deer ticks. Apply as a continuous band of insecticide around building foundation and around windows, doors, eaves, vents and other areas to greatly reduce the potential for entry by crawling pests. For easier application, remove debris and leaf litter from next to the foundation, cut back vegetation and branches that touch the foundation, and move or rake back rocks, deep mulch or other potential pest harborage next to the foundation. Apply a 3-foot band around the structure and upward along the foundation to 3 ft and around windows, doors and roof overhangs. Apply as a coarse spray to thoroughly and uniformly wet the foundation and/or band so that the insecticide will reach the soil or thatch level where pests may be active. One gallon will treat 250 sq ft of surface area.

OUTDOOR SURFACES USE: To kill ants*, centipedes, cockroaches, crickets, fleas, flies, gnats, millipedes, mosquitoes, pillbugs, scorpions, sowbugs, spiders and deer ticks. Apply as a residual treatment to ornamental plants next to foundations of buildings and to surfaces of buildings, porches, screens, window frames, eaves, patios, garages and other similar areas where these pests are active. Keep working for up to eight weeks on vinyl siding.

* Allegheny wood, Argentine, black carpenter, confield, field, Florida carpenter, harvester, honey, pavement, southern, sugar, nuisance.

ORNAMENTAL TREES, SHRUBS AND FLOWERS • For use on ornamental trees, shrubs and flowers such as but not limited to: Ageratum, Arborvitae, Arizona Cypress, Ash, Aster, Azaleas, Begonia, Birch, Boxwood, Box Elder, Camellias, Carnations, Cherry (ornamental), Chrysanthemums, Non-bearing Citrus, Coleus, Common Ninebark, Conifers, Douglas Fir, Elm, English ivy, Euonymus, Exacum, Weeping Fig, Gladioli, Gold Bells, Hawthorn, Holly, Honeysuckle, Hypoestes, Ivy, Juniper, Lilac, Locust, Maple, Marigold, Mimosa, Mock Orange, Nannyberry, Oak, Orchid, Palm, Pansy, Pea Shrub, Petunia, Philodendron, Pine. Ornamental Plum, Poinsettia, Poplar, Tulip Poplar, Rhododendron, Roses, Snapdragon, Snowberry, Spruce, Taxus, Willow, Zinnia.

To kill ants*, aphids, armyworms, azalea caterpillar, bagworms, black vine weevil (adult), box elder bugs, broadmeads, brown stink bugs, budworms, California oakworm, California redscale (crawlers), cankerworms, clover mites, cockroaches, crickets, cutworms, eastern tent caterpillar, elm leaf beetles, European sawfly, fall webworm, flea beetles, forest tent caterpillar, gypsy moth larvae, Japanese beetles (adults), June beetles (adults), lace bugs, leaf-feeding caterpillars, leathoppers, leafminers (adults), leaf rollers, leaf skeletonizers, mealworms, spider mites, spittlebugs, striped beetle, pillbug, pineneedle scale (crawler), pine sawfly, pine shoot beetles, pinetip moth, plant bugs, root weevil, sawfly, scale insects (crawlers), spiders, spider mites, spittlebugs, striped beetles, striped oakworm, thrips, tip moth, ussack moth larvae, whiteflies.

* Allegheny wood, Argentine, black carpenter, confield, field, Florida carpenter, harvester, honey, pavement, southern, sugar, nuisance.

Apply as a thorough foliar spray.

- For best results, apply early before insect populations are high.
- For scale control, treat entire plant, including stem, trunks and twigs.
- For bagworm control, apply when bagworm larvae begin to hatch.
- For best results, apply to both sides of plant leaves and all plant surfaces where insects are present.

CÓMO USAR

ANTES DE USAR:

1. Agite bien antes de cada uso.
2. Quite la calcomanía de la tapa abrá y abra. Deseche la calcomanía.
3. Retire el rociador de su ranura debajo del asa de la botella; quite y deseche la envoltura de plástico de la manguera para que el tubo se extienda por completo.
4. Oprima fuerte la punta negra de la manguera en la abertura de la tapa hasta que trabaje.
5. Sostenga el rociador por debajo del nivel del envase y cargúelo mediante el bombeo del mecanismo disparador varias veces hasta que salga el producto.
6. Ajuste la boquilla al nivel deseado.

DESPUÉS DE USAR:

7. Para guardar, gire la boquilla del rociador a la posición de cerrado.
8. NO desconecte la manguera.
9. Coloque el rociador nuevamente en su ranura. La manguera se puede meter en el asa del rociador.

NOTA: Este producto en general no mancha la mayoría de los revestimientos del hogar, dependiendo de la antigüedad y limpieza de los mismos. No obstante, antes de utilizarlo en áreas donde el rociador pueda entrar en contacto con el revestimiento del hogar, (en particular con revestimientos vinílicos) pruébelo en un lugar que no sea muy visible y verifique su efecto unas horas más tarde. No lo utilice si observa manchas.

CÉSPEDES • INSECTOS DE SUPERFICIE entre los que se incluyen hormigas*, gusanos soldados, cucarachas (alemana y americana), grillos, gusanos cortadores, tijeretas, tijeras europeas, pulgas, moscas de la fruta, escarabajos verdes de junio, polillas del césped (orgas tejedores del césped), milipés, cucarachas de caño, cochinitas de la humedad, acaros, cigarrillas, fleas, garrapatas de los venados (que pueden transmitir la enfermedad de Lyme), y chinches de agua. Humedezca el pasto completamente rociando con agua algunas horas antes de la aplicación. Aplique el rociador de modo que cubra completamente el césped. Con un galón se trata una superficie de 250 pies cuadrados. Para lograr el mejor control de los insectos de superficie no riegue más ni corte hasta después de transcurridos 24 horas de la aplicación. Trate las hormigas u otros insectos cuando éstos aparecen con primera vez o cuando observe daños en el césped. No lo aplique más de 10 veces por año, por lugar.

* Allegheny wood, argentina, carpintera negra, de los campos de maíz, de campo, carpinteras de la Florida, cosechadora, de la miel, del pavimento, del sur, del azúcar, molestas.

INSECTOS NOCIVOS FUERA DEL HOGAR • Para matar hormigas*, chinches, cucarachas, grillos, pulgas, moscas, jejenes, milipés, mosquitos, cochinitas, alacranes, cochinitas de la humedad, arañas y garrapatas de los venados. Aplique una franja continua de insecticida alrededor de los cimientos del edificio y de las ventanas, puertas, aleros, respiraderos y otras zonas para reducir en gran medida la posibilidad de que ingresen insectos nocivos rastros. Para que la aplicación sea más fácil, quite los restos y las hojas secas de la zona próxima a los cimientos, corte y retire la vegetación y las ramas que estén en contacto con los cimientos y mueva o rasque las rocas, el mantillo proleído u otros posibles reservorios de insectos nocivos próximos a los cimientos. Aplique una franja de 3 pies alrededor de la estructura, desde abajo hacia arriba, a lo largo de los cimientos hasta alcanzar una altura de 3 pies, y alrededor de las ventanas, puertas y salientes del techo. Aplique como rocío grueso a efectos de mojar bien y de manera uniforme los cimientos y/o la zona de la tierra, de modo que el insecticida llegue hasta la tierra o hasta el nivel de las brizas secas donde los insectos nocivos pueden estar activos. Con un galón se trata una superficie de 250 pies cuadrados.

USO EN SUPERFICIES EXTERIORES: Para matar hormigas*, chinches, cucarachas, grillos, pulgas, moscas, jejenes, milipés, mosquitos, cochinitas, alacranes, cochinitas de la humedad, arañas y garrapatas de los venados. Aplique como tratamiento de acción residual a plantas ornamentales próximas a los cimientos de edificios y a las superficies de edificios, porches, mosqueteros, marcos de ventanas, aleros, patios, cocheras y otros zonas similares donde hay actividad de estos insectos nocivos. Continúa actuando hasta por ocho semanas en el revestimiento vinílico.

* Allegheny wood, argentina, carpintera negra, de los campos de maíz, de campo, carpinteras de la Florida, cosechadora, de la miel, del pavimento, del sur, del azúcar, molestas.

ARBÓLES, ARBUSTOS Y FLORES ORNAMENTALES • Para usar en árboles, arbustos y flores ornamentales como por ejemplo: Agerato, árbol de la vida, ciprés de Arizona, treasa, aster, azaleas, begonia, abedul, boj, arce, camelias, claveles, cerezo (ornamental), crisantemos, cítricos sin fructificación, coles, escarabajo, conilera, abeto Douglas, álamo, hiedra inglesa, evonimo, violeta persa, ficus benjamina, abeto, gladiolos, narcisos de oro, espino, acebo, madreselva, hipocistes, hiedra, enebro, lirio, algarrobo, arce, caléndula, mimosa, Mock orange, viburno, roble, arquileja, palma, pensamiento, cajúpana, petunia, filodendro, pino, ciruelo ornamental, nochebueno, álamo blanco o negro, tulipano, rododendro, rosas, boca de dragón, bolita de nieve, abeto, teje, sauce, Zinnia.

Para matar hormigas*, aridos, gusanos soldados, oruga de las azaleas, gusanos del sauce, gorgojos de los invernaderos (adultos), insectos del arce, ácaros blancos, cochinitas blancas marbrón, gusanos de las yemas, oruga de California, cochinita roja de California (etapa móvil), orugas ulcerosas, ándas de trébol, cucarachas, grillos, gusanos cortadores, gusanos laderos del este, escarabajos de la hoja del olmo, defoliador de pinos, oruga tejedora del olmo, crisomélidos, oruga del álamo lémbrón, larvas de polilla gita, escarabajos japoneses (adultos), escarabajos de junio (adultos), chinches de encaje, orugas que se alimentan de hojas, saltamontes, gusanos minadores (adultos), enrolladores de hojas, defoliadores, cochinitas hormosas, gusanos, larvas de Syantillia epilias, cochinita, cochinita blanca del pino (etapa móvil), defoliador de pinos, escarabajos de los brotes de pino, barrenador de los brotes de pino, chinches, gorgojos de la raíz, defoliador, cochinitas (etapa móvil), arañas, ácaros tetranididos, cigarrillas, escarabajos rayados, oruga rayada (Anisota senatoria), trips, barrenador de los brotes, orugas peludas, moscas blancas.

* Allegheny wood, argentina, carpintera negra, de los campos de maíz, de campo, carpinteras de la Florida, cosechadora, de la miel, del pavimento, del sur, del azúcar, molestas.

Aplique como un rocío foliar completo.

- Para obtener mejores resultados, aplique antes de que las poblaciones de insectos sean grandes.
- Para el control de las cochinitas, trate toda la planta, incluso el tallo, troncos y ramitas.

VEGETABLES • For use on Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cavallo Broccoli, Cauliflower, Chinese Broccoli, Chinese Cabbage, Chinese Mustard and Kohlrabi to control: **alfalfa looper, cabbage looper, imported cabbageworm, southern cabbageworm, cutworm, cabbage webworm, diamondback moth, armyworm, beet armyworm, fall armyworm, yellow-striped armyworm, corn earworm, flea beetle, Japanese beetle (adult), grasshopper, leafhopper, plant bug, including lygus bug, stink bug, meadow spittlebug, aphid, whitefly, thrips, spider mite.**

For use on Corn (sweet and pop) to control: **cutworm, western bean cutworm, corn earworm, green cloverworm, meadow spittlebug, tobacco budworm, European corn borer, southwestern corn borer, stalk borer, hop vine borer, armyworm, beet armyworm, western corn rootworm beetle (adult), northern corn rootworm beetle (adult), southern corn rootworm beetle (adult), Mexican corn rootworm beetle (adult), bean leaf beetle, cereal leaf beetle, Japanese beetle (adult), sap beetle (adult), stink bug, grasshopper, corn leaf aphid, English grain aphid, chinch bug, green bug.**

Sweet Corn only: **southern armyworm, western bean cutworm, lamished plant bug, aster leafhopper, aphid, spider mite, soil silky (adult).**

For use on Lettuce (head and leaf) to control: **alfalfa looper, cabbage looper, imported cabbageworm, cutworm, saltmarsh caterpillar, green cloverworm, diamondback moth, armyworm, beet armyworm, fall armyworm, southern armyworm, corn earworm, tobacco budworm, European corn borer, flea beetle, Japanese beetle (adult), vegetable weevil (adult), grasshopper, leafhopper, plant bug, stink bug, meadow spittlebug, aphid, whitefly, spider mite.**

For use on Onion (bulb) and Garlic to control: **cutworm, seedcorn maggot (adult), onion maggot (adult), leafminer (adult), armyworm, onion thrips, tobacco thrips, western flower thrips, flower thrips, aphid, plant bug, stink bug.**

For use on Tomato and Tomatillo to control: **cabbage looper, cutworm spp., hornworm, tomato fruitworm, tobacco budworm, tomato pinworm, beet armyworm, southern armyworm, yellow-striped armyworm, fall armyworm, European corn borer, leafminer, Colorado potato beetle, flea beetle, grasshopper, leafhopper, aphid, whitefly, meadow spittlebug, stink bug, plant bug.**

Apply for uniform coverage. Try to hit underside of leaves. Do not apply more than five times per growing season to corn. For all other crops, do not apply more than nine times per growing season.

NUMBER OF DAYS TO WAIT BETWEEN THE LAST APPLICATION AND HARVEST (PHI)	
VEGETABLES	PHI
Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cavallo Broccoli, Cauliflower, Chinese Broccoli, Chinese Cabbage, Chinese Mustard, Kohlrabi, Lettuce (head and leaf)	1
Tomatoes and Tomatillos	5
Onions (bulb), Garlic	14
Corn (sweet and pop)	21
PHI = Pre-Harvest Interval	

STORAGE AND DISPOSAL

Store in a cool dry area away from heat or open flame. If empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling, if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

First Aid • **If on skin or clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor or going for treatment.

Environmental Hazards • This product is extremely toxic to fish and other aquatic organisms. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectraicide.com

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 9688-195-8845 EPA Est. Nos. 39754-WI-1 (R) 9688-MO-1 (R) 79533-WI-1 (R) 58996-MO-1 (AE)
11623-GA-1 (R), 11623-GA-3 (R) Circled letter is first letter of lot number. 17-14381 © 2012 UIC

• Para el control de los gusanos del saco (bagworm), aplique cuando las larvas de los gusanos del saco comienzan a salir.

• Para obtener mejores resultados, use en ambos lados de las hojas y en todas las superficies de la planta donde haya insectos.

HORTALIZAS • Para usar en brócoli, coles de Bruselas, col, brócoli cavalo, coliflor, brócoli chino, col China, mostaza parda y colinabo para controlar: **gusano medidor de la alfalfa, falso medidor de la col, gusano sureño de la col, gusano cortador, oruga de la col, polilla de la col, gusano soldado, gusano importado del betabel, gusano cogolero, gusano piro, isoca del maíz, crisomélidos, escarabajo japonés (adulto), saltamontes, saltarilla, chinche, incluso chinche lygus, chinche hedionda, cigarrilla espumadora, áfido, mosca blanca, trips, ácaros tetranychidos.**

Para usar en maíz (dulce y de palomitas) para controlar: **gusano cortador, gusano cortador del arroz entomológico, isoca del maíz, gusano verde del trébol, cigarrilla espumadora, gusano cogolero del tabaco, barrenador europeo del maíz, barrenador del maíz del sureste, barrenador del tallo, barrenador (Hydracca immanis), gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano de la raíz del maíz del oeste (adulto), gusano de la raíz del maíz del norte (adulto), gusano de la raíz del maíz del sur (adulto), gusano de la raíz del maíz de México (adulto), escarabajo de la hoja del frijol, escarabajo de la hoja del cereal, escarabajo japonés (adulto), escarabajo (Carophilus lugubris) (adulto), chinche hedionda, saltamontes, pulgón del maíz, pulgón de la espiga, chinche, chinche verde.**

Sóloamente en maíz: **gusano soldado sureño, gusano cortador del frijol occidental, insecto de planta deslustrado, cicadélidos, áfido, ácaros tetranychidos, mosca del maíz (adulto).**

Para usar en lechuga (hojas y corazón) para controlar: **gusano medidor de la alfalfa, falso medidor de la col, gusano importado de la col, gusano cortador, gusano polido, gusano verde del trébol, polilla de la col, gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano cogolero, gusano soldado sureño, isoca del maíz, gusano cogolero del tabaco, barrenador europeo del maíz, crisomélidos, escarabajo japonés (adulto), porpajo de las hortalizas (adulto), saltamontes, saltarilla, chinche, chinche hedionda, cigarrilla espumadora, áfido, mosca blanca, ácaros tetranychidos.**

Para usar en cebolla (bulbo) y ajo para controlar: **gusano cortador, gusano de la semilla del maíz (adulto), larva de mosca de la cebolla (adulto), gusano minador (adulto), gusano soldado, trips de la cebolla, trips del tabaco, trips occidental de las flores, trips de las flores, áfido, chinche, chinche hedionda.**

Para usar en tomates y tomatillos para controlar: **falso medidor de la col, especies de gusanos cortadores, gusano cornudo, gusano del fruto del tomate, gusano cogolero del tabaco, gusano alfiler, gusano soldado del betabel, gusano soldado sureño, gusano piro, gusano cogolero, barrenador europeo del maíz, gusano minador, escarabajo de la papa de Colorado, crisomélidos, saltamontes, saltarilla, áfido, mosca blanca, cigarrilla espumadora, chinche hedionda, chinche. Aplique de modo de lograr una cobertura uniforme. Trate de rociar la parte inferior de las hojas. No aplique al maíz más de cinco veces por temporada de cultivo. Para todos los demás cultivos, no aplique más de nueve veces por temporada de cultivo.**

CANTIDAD DE DÍAS QUE SE DEBEN ESPERAR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA (IPC)	
HORTALIZAS	IPC
Brócoli, Coles de Bruselas, Col, Brócoli cavalo, Coliflor, Brócoli chino, Col China, Mostaza parda, Colinabo, Lechuga (corazón y hojas)	1
Tomates y Tomatillos	5
Cebolla (bulbo), Ajo	14
Maíz (dulce y de palomitas)	21
IPC = Intervalo previo a la cosecha	

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor o del fuego. Si está vacío: Envaso no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Tirarlo en la basura u ofrecido para reciclar, si existe esa opción. Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se absorbe por la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabacco.

PRIMEROS AUXILIOS • Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quitar la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente • Este producto es extremadamente tóxico para los peces y otros organismos acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipa lluvia en las siguientes 24 horas asegurará que el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

NOTA: Hasta que no sea compatible con el pesticida pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.